

# Surveillance de Seconde Génération sur les IST, VIH et Sida à Madagascar

Jeunes

TDS

Camionneurs

Militaires

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE  
DE SURVEILLANCE COMPORTEMENTALE  
(ESC\_2006)

ET

COMPARAISON DE RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE SURVEILLANCE COMPORTEMENTALE  
(ESC\_2004 - ESC\_2006)

Agences d'exécution : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INSTAT) à travers la DIRECTION  
DE LA DEMOGRAPHIE ET DES STATISTIQUES SOCIALES (DDSS), FOCUS DEVELOPMENT

Etude financée par : L'UNDP, LA BANQUE MONDIALE à travers le PMPS, LE FONDS MONDIAL de  
la lutte contre le VIH et le Sida

### INTRODUCTION

L'enquête de surveillance comportementale (ESC) 2006, qui fait suite à celle de 2004, permet de mettre en évidence les tendances en changements de comportements qui amènent à la réduction d'infection à VIH. Il s'agit notamment de la réduction du nombre des partenaires sexuels et de l'augmentation de l'utilisation du préservatif avec les partenaires non-réguliers.

Les informations fournies par ces enquêtes peuvent aider à guider les programmes d'intervention en donnant aux planificateurs des programmes une image claire des comportements à risque dans les différentes catégories de la population. En même temps, ces données peuvent être utilisées pour avoir une idée sur les effets combinés d'interventions.

La réalisation des enquêtes de surveillances comportementales est justifiée par la nécessité des données sur les tendances comportementales dans les populations cibles. Ces données seront complémentaires à celles de la surveillance biologique déjà en cours depuis plusieurs années et permettront aux décideurs, ainsi qu'aux intervenants dans la lutte contre les IST/VIH/SIDA, de suivre l'évolution de l'épidémie et d'orienter leurs actions de prévention sur terrain.

### OBJECTIFS

L'objectif général de l'ESC est de mesurer les tendances comportementales vis à vis des IST/VIH/SIDA afin de fournir les informations au Comité national de Lutte contre le Sida et aux intervenants dans leurs activités de prévention.

Ses objectifs spécifiques sont les suivants:

Suivre les tendances dans le temps et dans l'espace des comportements à risque au sein des populations à risque;

Améliorer la surveillance du VIH et du Sida dans le système national de surveillance des maladies transmissibles (surveillance intégrée des maladies);

Evaluer les effets combinés globaux des interventions menées dans le pays.

### GROUPES CIBLES

Lors de la première enquête de surveillance comportementale, les groupes cibles suivants ont été considérés comme les populations à risque et qui feront l'objet de suivi lors de la deuxième enquête. Il s'agit des travailleurs de sexe (TDS), des jeunes de 15 à 24 ans, des camionneurs et des militaires.

Les **TDS**

On définit ces individus comme étant des personnes de sexe féminin qui échangent habituellement des rapports sexuels avec leurs partenaires pour de l'argent ou des biens en nature et qui se reconnaissent comme telles. Les travailleurs de sexe, aussi bien formelles que non formelles, sont considérées comme groupe cible

Les **Jeunes de 15 à 24 ans**

Il s'agit des adolescentes et jeunes, des filles et garçons, âgés de 15 à 24 ans et qui n'ont jamais été mariés. L'échantillon inclura aussi bien les scolaires que les non scolaires et les déscolarisés.

Les **Camionneurs**

Les chauffeurs de camions et leurs aides, âgés de 15 à 49 ans, convoyant des biens et marchandises, qui circulent dans les grands axes routiers de Madagascar sont à inclure dans ce groupe cible

Les **Militaires**

Il s'agit des militaires en exercice au sens strict du terme, y compris les gendarmes, excluant les policiers et les agents de sécurité. Ce sont les militaires localisés essentiellement dans les camps ou casernes et au niveau des écoles réparties dans les 6 provinces de la Grande Ile.

TAILLE DE L'ÉCHANTILLON : 20.811 enquêtés dont 10 814 filles et 9 997 garçons

SITES DE L'ENQUETE : Antsiranana, Nosy-Be, Sambava, Mahajanga, Toamasina, Sainte-Marie, Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara, Morondava, et Taolagnaro (anciens sites); Tsiroanomandidy I, Belobaka, Miarinarivo I, Anosibe Ifanja, Maintirano, Betanatanana, Antsirabe I, Behenjy, Ambohitra I, Ilaka Centre, Morondava, Manakara I, Lokomby, Ihosy I, Sakalalina, Farafangana, Ambohimandroso, Ambovombe, Ambondro, Ambatondrazaka, Imerimandroso, Fénérive Est, Mahambo, Maevatanàna, Andriba, Antsohihy et Ampandriankilandy (nouveaux sites).

AUPRES DES JEUNES DE 15 À 24 ANS

CARACTERISTIQUES DES ENQUETES	HOMMES	FILLES
Répartition des jeunes enquêtés selon le milieu de résidence	Urbain : 49.8% Rural : 50.2%	Urbain : 48.8% Rural : 51.2%
La majorité des jeunes enquêtés sont âgés de moins de 20 ans	61.3%	70.1%
Plus de (1/3) un jeune sur trois ont un niveau d'instruction secondaire 1	36.9%	36.3%
Presque (1/4) un jeune sur quatre ont un niveau d'instruction secondaire 2	19.7%	18.6%
La majorité des jeunes ont déclarées de confession chrétienne :	40.2% catholique 34.7% protestante	43.4% catholique 36.1% protestante
COMPORTEMENTS A RISQUE ET SEXUELS	HOMMES	FEMMES
Taux de consommation d'alcool au cours des 4 dernières semaines précédant l'enquête	33.1%	12.4%
Taux de consommation de drogue	6.6%	0.4%
Pourcentage des jeunes sexuellement actifs	72.9%	67%
Proportion des jeunes ayant eu des rapports sexuels monnayés ou gratifiés	29.3%	24.2%
Proportion des jeunes ayant eu leurs premiers rapports sexuels au plus tard à 15 ans	32.8%	39.3%
Proportion des jeunes ayant eu leurs premiers rapports sexuels au plus tard à 18 ans	59.3%	56.9%
Age médian aux premiers rapports sexuels	16.8 ans	16.5 ans
Proportion des jeunes ayant eu des partenaires multiples (2 ou plus) au cours des 12 derniers mois	42.2%	22.5%

COMPORTEMENTS A RISQUE ET SEXUELS	HOMMES	FEMMES
Proportion des jeunes ayant déclaré connaître le condom	94.6%	91.5%
Proportion des jeunes connaissant un endroit où elles peuvent s'en procurer	81.7%	73.5%
Pourcentage des jeunes qui ont déjà utilisé le condom à un moment quelconque de la vie	34.2%	30.9%
Pourcentage des jeunes qui ont utilisé le condom aux premiers rapports sexuels	8.1%	10.2%
Pourcentage des jeunes qui ont utilisé le condom lors du dernier rapport sexuel	16%	16%
Pourcentage des jeunes qui ont utilisé le condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire de type commercial	26.9%	22%
Pourcentage des jeunes ayant utilisé le condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire de type non commercial	14.1%	16.5%
Pourcentage des jeunes ayant utilisé le condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire occasionnel	34.2%	40.7%
INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES	HOMMES	FEMMES
Proportion des jeunes ne connaissant aucun signe de l'IST chez la femme	43.5%	33.8%
Proportion des jeunes ne connaissant aucun signe de l'IST chez l'homme.	26.6%	39.2%
Proportion des jeunes ayant déjà eu au moins l'un des deux signes d'IST.	écoulement urétral : 10.5% boutons : 5% plaies sur le sexe 12.2%	écoulement vaginal : 6.6% boutons : 2.9% plaies sur le sexe 7.9%
Proportion des jeunes qui sont allées auprès du personnel de santé, dans un hôpital ou une clinique pour chercher des conseils ou se faire soigner	67.8%	57.5%
Proportion des jeunes ayant averti leurs partenaires sexuels dès qu'elles ont constaté le signe anormal annonçant la présence d'IST chez elles	15.3%	30.5%
Proportion des jeunes ayant fait quelque chose pour éviter de transmettre l'infection à leurs partenaires sexuels	76.5%	61.2%

AUPRES DES JEUNES DE 15 À 24 ANS

CONNAISSANCE, PREVENTION ET OPINION SUR LE VIH ET LE SIDA	HOMMES	FEMMES
Proportion des jeunes déclarant connaître ou avoir entendu parler du SIDA	93.9%	94.1%
Proportion des jeunes connaissant les trois principaux moyens de prévention du SIDA		
Spontané	11%	11%
Assisté	66.8%	65.8%
Proportion de jeunes qui savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut être porteuse du virus du SIDA et le transmettre et qui rejettent au moins deux des conceptions erronées sur la transmission du Sida.	57.2%	57.4%
Proportion des jeunes qui connaissent les deux principaux moyens de prévention du VIH/ SIDA (fidélité et utilisation de condom) et qui rejettent au moins trois méthodes erronées de transmission du VIH	45.7%	45.1%
Proportion de jeunes ayant une attitude positive vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	14.6%	15.3%
Proportion de jeunes qui ont fait le test de dépistage de VIH	8.9%	10.2%
Proportion de jeunes ayant fait volontairement le test de dépistage de VIH	8.6%	9.3%
Proportion de jeunes ayant fait le test de dépistage et reçu le résultat	7.7%	8.7%
Principales raisons évoquées expliquant le désintérêt au résultat du test		
Manque de temps	55.1%	47%
Estime être en bonne santé	16.1%	12.5%
EXPOSITION AUX INTERVENTIONS ET AUX MEDIAS	HOMMES	FEMMES
Proportion de jeunes qui déclarent avoir vu ou entendu quelque chose sur le VIH / SIDA au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête	72%	64%
Proportion des jeunes ayant écouté la radio au cours des 4 dernières semaines	78.6%	67.6%
Proportion des jeunes ayant regardé la télévision au cours des 4 dernières semaines	42%	40.3%

TAILLE DE L'ÉCHANTILLON : 1 681 Travailleurs de sexe

SITES DE L'ENQUÊTE : Les villes d'Antananarivo, de Fianarantsoa, de Toamasina, de Mahajanga, de Toliara d'Antsiranana (anciens sites) et de Taolagnaro

CARACTERISTIQUES DES ENQUETES	ESC 2006
Presque deux TDS sur trois (2/3) ont été rencontrées dans les voies et places publiques	61.1%
Environ une TDS sur six (1/6) ont été rencontrées dans les boîtes de nuit	15.5%
Presque une TDS sur trois (1/3) sont âgées de 20-24 ans	29.3%
La majorité des TDS ne sont pas en union	85.8%
Presqu'une TDS sur deux (1/2) ont un niveau d'instruction secondaire 1	46.3%
COMPORTEMENTS A RISQUE ET SEXUELS	ESC 2006
Taux de consommation d'alcool au cours des 4 dernières semaines précédant l'enquête	52.3%
Taux de consommation de drogue	13.3%
Proportion des TDS ayant eu leurs premiers rapports sexuels payants au plus tard à 15 ans	10.5%
Age médian aux premiers rapports sexuels payants	20.5 ans
Nombre médian de partenaires sexuels durant les 7 derniers jours	4.1
Proportion des TDS ayant déclaré connaître le condom	99.8%
Proportion des TDS connaissant un endroit où elles peuvent s'en procurer	97%
Taux d'utilisation de condom à un moment quelconque de la vie	96.5%
Taux d'utilisation de condom aux premiers rapports sexuels	15.1%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire de type commercial	79.4%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire de type non commercial	46%
INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES	ESC 2006
Proportion des TDS ne connaissant aucun signe de l'IST chez la femme	28.9%
Proportion des TDS ne connaissant aucun signe de l'IST chez l'homme.	37.5%
Proportion des TDS ayant déjà eu au moins l'un des deux signes d'IST (écoulement vaginal, boutons ou plaies sur le sexe).	15.2%
Proportion des TDS qui sont allées auprès du personnel de santé, dans un hôpital ou une clinique pour chercher des conseils ou se faire soigner	82.4%
Proportion des TDS ayant averti leurs partenaires sexuels dès qu'elles ont constaté le signe anormal annonçant la présence d'IST chez elles	22.7%
Proportion des TDS ayant fait quelque chose pour éviter de transmettre l'infection à leurs partenaires sexuels	69.9%

CONNAISSANCE, PREVENTION ET OPINION SUR LE VIH ET LE SIDA	ESC 2006
Proportion des TDS déclarant connaître ou avoir entendu parler du SIDA	91%
Proportion des TDS connaissant les trois principaux moyens de prévention du SIDA	60%
Proportion de TDS qui savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut être porteuse du virus du SIDA et le transmettre et qui rejettent au moins deux des conceptions erronées sur la transmission du SIDA.	43.6%
Proportion de TDS ayant une attitude positive vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	11%
Proportion de TDS qui ont fait le test de dépistage de VIH	52.6%
Proportion de TDS ayant fait volontairement le test de dépistage de VIH	50.7%
Proportion de TDS ayant fait le test de dépistage et reçu le résultat	49.1%
Principales raisons évoquées expliquant le désintérêt au résultat du test	manque de temps : 47.2% Peur : 13.2%

EXPOSITION AUX INTERVENTIONS ET AUX MEDIAS	ESC 2006
Proportion de TDS qui déclarent avoir vu ou entendu quelque chose sur le VIH et le Sida au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête	61.5%
Proportion des TDS ayant regardé la télévision au cours des 4 dernières semaines	62.1%
Proportion des TDS ayant écouté la radio au cours des 4 dernières semaines	62.8%

TAILLE DE L'ÉCHANTILLON : 1 493 Camionneurs

AXES DE L'ENQUÊTE : Antananarivo, Antsirabe, Tsiroanomandidy, Fianarantsoa, Ihosy, Manakara, Moramanga, Vohibinany, Toamasina, Ambondromamy, Mahajanga, Morondava, Taolagnaro, Toliary, Ambilobe, Antsiranana

CARACTERISTIQUES DES ENQUETES	ESC 2006
Presque un quart des camionneurs enquêtés sont âgés moins de 25 ans	24%
La majorité des camionneurs sont en union	71%
Presque un camionneur sur trois (1/3) ont atteint le niveau d'instruction secondaire 2 et plus	27,3%
Environ deux camionneurs sur cinq (2/5) ont déclaré absent de la maison pendant au moins 1 mois ou plus au cours des 12 derniers mois	43,1%
COMPORTEMENTS A RISQUE ET SEXUELS	ESC 2006
Taux de consommation d'alcool au cours des 4 dernières semaines précédant l'enquête	58.3%
Taux de consommation de drogue	33.2%
Pourcentage des camionneurs ayant déjà eu de rapports sexuels avec un partenaire de sexe masculin	0.4%
Pourcentage des camionneurs ayant eu des rapports sexuels monnayés au cours des 12 derniers mois	22.3%
Proportion des camionneurs ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 15 ans	11.8%
Pourcentage des camionneurs ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 18 ans	56.2%
Age médian aux premiers rapports sexuels	18.3 ans
Pourcentage des camionneurs ayant eu des partenaires multiples (plus de 2 partenaires) au cours des 12 derniers mois	39%
Proportion des camionneurs ayant déclaré connaître le condom	98.3%
Proportion des camionneurs connaissant un endroit où elles peuvent s'en procurer	91%
Taux d'utilisation de condom à un moment quelconque de la vie	63%
Taux d'utilisation de condom aux premiers rapports sexuels	9.2%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel	22.8%



COMPORTEMENTS A RISQUE ET SEXUELS	ESC 2006
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire régulier (maitresse/petite amie)	37%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier de type commercial	69.1%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier de type non commercial	48%
INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES	ESC 2006
Proportion des camionneurs ne connaissant aucun signe de l'IST chez la femme	54.7%
Proportion des camionneurs ne connaissant aucun signe de l'IST chez l'homme.	28.3%
Proportion des camionneurs ayant déjà eu des signes d'IST	
Ecoulement urétral	6.6%
Boutons ou plaies sur le sexe	2.7%
Au moins 1 des deux signes	8.7%
Proportion des camionneurs qui sont allées auprès du personnel de santé, dans un hôpital ou une clinique pour chercher des conseils ou se faire soigner	67.2%
Proportion des camionneurs ayant averti leurs partenaires sexuels dès qu'elles ont constaté le signe anormal annonçant la présence d'IST chez elles	22.7%
Proportion des camionneurs ayant fait quelque chose pour éviter de transmettre l'infection à leurs partenaires sexuels	65.5%

CONNAISSANCE, PREVENTION ET OPINION SUR LE VIH ET LE SIDA	ESC 2006
Proportion des camionneurs déclarant connaître ou avoir entendu parler du SIDA	93.8%
Proportion des camionneurs connaissant les trois principaux moyens de prévention du SIDA	0.5% réponse spontanée 54.9% réponse assistée
Proportion de camionneurs qui savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut être porteuse du virus du SIDA et le transmettre et qui rejettent au moins deux des conceptions erronées sur la transmission du SIDA.	56.3%
Proportion de camionneurs ayant une attitude positive vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	8.9%
Proportion de camionneurs qui ont fait le test de dépistage de VIH	18.9%
Proportion de camionneurs ayant fait volontairement le test de dépistage de VIH	17%
Proportion de camionneurs ayant fait le test de dépistage et reçu le résultat	16.7%
Principales raisons évoquées expliquant le désintérêt au résultat du test	78.1% manque de temps

EXPOSITION AUX INTERVENTIONS ET AUX MEDIAS	ESC 2006
Proportion de camionneurs qui déclarent avoir vu ou entendu quelque chose sur le VIH / SIDA au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête	52%
Proportion des camionneurs ayant regardé la télévision au cours des 4 dernières semaines	61.5%
Proportion des camionneurs ayant écouté la radio au cours des 4 dernières semaines	57.7%

TAILLE DE L'ÉCHANTILLON : 1498 Militaires

SITES DE L'ENQUÊTE : Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga, Toliary, Antsiranana (anciens sites) ; Antsirabe, Amboitra, Moramanga (nouveaux sites)

CARACTERISTIQUES DES ENQUETES	ESC 2006
Environ un militaire sur dix (1/10) ont moins de 25 ans	11.4%
Presque un militaire sur cinq sont âgés de 25-29 ans	19.6%
La majorité des militaires sont en union	81%
Presque trois militaires sur quatre ont atteint le niveau d'instruction secondaire 2	74.8%
Environ le tiers des militaires enquêtés ont déclaré absent de la maison pendant au moins 1 mois au cours des 12 derniers mois	32.5%
COMPORTEMENTS A RISQUE ET SEXUELS	ESC 2006
Taux de consommation d'alcool au cours des 4 dernières semaines précédant l'enquête	64.6%
Taux de consommation de drogue	19.3%
Pourcentage des militaires ayant déjà eu de rapports sexuels avec un partenaire de sexe masculin	0.3%
Pourcentage des militaires ayant eu des rapports sexuels monnayés au cours des 12 derniers mois	9%
Proportion des militaires ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 15 ans	10.3%
Pourcentage des militaires ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant 18 ans	47.6%
Age médian aux premiers rapports sexuels	18.6 ans
Pourcentage des militaires ayant eu des partenaires multiples (plus de 2 partenaires) au cours des 12 derniers mois	34.5%
Proportion des militaires ayant déclaré connaître le condom	99.8%
Proportion des militaires connaissant un endroit où elles peuvent s'en procurer	97.8%
Taux d'utilisation de condom à un moment quelconque de la vie	72%
Taux d'utilisation de condom aux premiers rapports sexuels	6.3%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel	16%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire régulier (maitresse/petite amie)	34.9%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier de type commercial	71.8%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier de type non commercial	47.7%

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES	ESC 2006
Proportion des militaires ne connaissant aucun signe de l'IST chez la femme	32.4%
Proportion des militaires ne connaissant aucun signe de l'IST chez l'homme	13%
Proportion des militaires ayant déjà eu des signes d'IST	
Ecoulement urétral	3.9%
Boutons ou plaies sur le sexe	1.6%
Au moins 1 des deux signes	4.6%
Proportion des militaires qui sont allées auprès du personnel de santé, dans un hôpital ou une clinique pour chercher des conseils ou se faire soigner	75.9%
Proportion des militaires ayant averti leurs partenaires sexuels dès qu'elles ont constaté le signe anormal annonçant la présence d'IST chez elles	32.9%
Proportion des militaires ayant fait quelque chose pour éviter de transmettre l'infection à leurs partenaires sexuels	65.8%
CONNAISSANCE, PREVENTION ET OPINION SUR LE VIH ET SIDA	ESC 2006
Proportion des militaires déclarant connaître ou avoir entendu parler du SIDA	98.6%
Proportion des militaires connaissant les trois principaux moyens de prévention du SIDA	53%
Proportion de militaires qui savent qu'une personne apparemment en bonne santé peut être porteuse du virus du SIDA et le transmettre et qui rejettent au moins deux des conceptions erronées sur la transmission du SIDA.	84%
Proportion de militaires ayant une attitude positive vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	26.5%
Proportion de militaires qui ont fait le test de dépistage de VIH	44.8%
Proportion de militaires ayant fait volontairement le test de dépistage de VIH	40.9%
Proportion de militaires ayant fait le test de dépistage et reçu le résultat	38.8%
Principales raisons évoquées expliquant le désintérêt au résultat du test	37.1% manque de temps
	6.7% pas urgent
EXPOSITION AUX INTERVENTIONS ET AUX MEDIAS	ESC 2006
Proportion de militaires qui déclarent avoir vu ou entendu quelque chose sur le VIH / SIDA au cours des 6 derniers mois précédant l'enquête	75.6%
Proportion des militaires ayant regardé la télévision au cours des 4 dernières semaines	84.8%
Proportion des militaires ayant écouté la radio au cours des 4 dernières semaines	90.7%

INDICATEURS	Années	Jeunes Hommes	Jeunes Femmes	Travailleurs de sexe	Camionneurs	Militaires
<b>Comportements à risque et sexuels</b>						
Taux de consommation d'alcool au cours des 4 dernières semaines précédant l'enquête	2006	34%	13.9%	53.1%	56.9%	64.5%
	2004	32%	13%	53%	55%	59%
Taux de consommation de drogue	2006	6.7%	0.8%	14.4%	32.1%	19.7%
	2004	7%	1%	18%	25%	19%
Proportion des enquêtés masculins ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire de sexe masculin	2006				0.5%	0.3%
	2004				1%	1%
Proportion des enquêtés ayant eu des rapports sexuels monnayés au cours des 12 derniers mois	2006	34.2%	24.5%		17.8%	9.1%
	2004	31%	33%		24%	12.7%
Proportion des enquêtés ayant eu des partenaires multiples (plus de 2 partenaires) au cours des 12 derniers mois	2006	43.5%	21.9%		41.8%	35.2%
	2004	39%	26%		48%	40%
Nombre médian de partenaires sexuels durant les 7 derniers jours	2006			4.1%		
	2004			3,9%		
<b>Connaissance et de l'utilisation du condom</b>						
Proportion des enquêtés ayant déclaré connaître le condom	2006	97.4%	94.5%	99.8%	97.7%	99.8%
	2004	91%	85%	98%	99%	99.1%
Proportion des enquêtés connaissant un endroit où elles peuvent s'en procurer	2006	85.8%	76.3%	97.4%	91.4%	97.7%
	2004	82%	75%	96%	95%	96%
Taux d'utilisation de condom à un moment quelconque de la vie	2006	41.3%	38.2%	97.6%	62%	71.5%
	2004	36%	31%	95%	63%	68%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier de type commercial	2006	28%	24.6%	81.1%	76.5%	70.8%
	2004	24%	20%	76%	67.8%	78.1%

INDICATEURS	Années	Jeunes Hommes	Jeunes Femmes	Travailleurs de sexe	Camionneurs	Militaires
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier de type non commercial	2006	18.1%	19.7%	43.5%	39%	47.4%
	2004	20%	16%	34%	53.8%	56.4%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel	2006	20.6%	19.8%		21.4%	15.8%
	2004	19%	17%		19%	22%
Taux d'utilisation de condom lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire régulier (maitresse/petite amie)	2006				40.4%	34.4%
	2004				33.9%	32.3%
<b>Comportements en matière des Infections Sexuellement Transmissibles</b>						
Proportion des enquêtés ne connaissant aucun signe de l'IST chez la femme	2006	45.1%	37.5%	27.9%	51.4%	33.6%
	2004	39%	37%	25%	45%	22%
Proportion des enquêtés ne connaissant aucun signe de l'IST chez l'homme.	2006	22.6%	43.8%	36.2%	21.7%	13.5%
	2004	27%	48%	31%	21%	11%
Proportion des enquêtés ayant déjà eu au moins l'un des deux signes d'IST (écoulement urétral, boutons ou plaies sur le sexe).	2006	15.5%	10.3%	15.2%	5.3%	4.9%
	2004	15%	12%	18%	9%	12%
Proportion des enquêtés qui sont allées auprès du personnel de santé, dans un hôpital ou une clinique pour chercher des conseils ou se faire soigner	2006	72.7%	54.3%	81.5%	60%	88%
	2004	64%	87%	73%	87.5%	79.7%
Proportion des enquêtés ayant averti leurs partenaires sexuels dès qu'elles ont constaté le signe anormal annonçant la présence d'IST chez elles	2006	15%	30.6%	19.4%	15%	35.1%
	2004	17%	30%	14%	30.4%	42%
Proportion des enquêtés ayant fait quelque chose pour éviter de transmettre l'infection à leurs partenaires sexuels	2006	82.9%	61.5%	68.5%	55%	66.2%
	2004	69%	63%	62%	83.9%	62%

Résultats de l'enquête de surveillance comportementale, années 2004 - 2006

COMPARAISON DES RESULTATS (ESC\_2004 - ESC\_2006)

INDICATEURS	Années	Jeunes Hommes	Jeunes Femmes	Travailleurs de sexe	Camionneurs	Militaires
<b>Connaissance, Prévention et Opinion sur le VIH et le Sida</b>						
Proportion des enquêtés déclarant connaître ou avoir entendu parler du SIDA	2006	95.7%	94.3%	91.5%	94.3%	98.7%
	2004	95%	96%	90%	94%	99%
Proportion des enquêtés connaissant les trois principaux moyens de prévention du SIDA	2006	66.7%	64.4%	60.5%	59%	52.5%
	2004	63%	57%	50%	53%	48%
Proportion des enquêtés ayant une attitude positive vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH	2006	13.7%	13.3%	11.7%	8.4%	25.2%
	2004	8%	8%	8%	7.8%	22%
<b>Résultats sur le dépistage de VIH</b>						
Proportion des enquêtés ayant fait volontairement le test de dépistage de VIH	2006	6.9%	6.9%	56%	14.4%	42.1%
	2004	3%	4%	36%	11.4%	25.2%
Proportion des enquêtés ayant fait le test de dépistage et reçu le résultat	2006	6.2%	6.7%	35%	13.6%	40.1%
	2004	2%	4%	54.7%	11.7%	25.2%
Principales raisons évoquées expliquant le désintérêt au résultat du test	2006	55.1% manque de temps	47% manque de temps	46.9% manque de temps	90% manque de temps	39.3% manque de temps
		16.1% pas urgent	12.5% pas urgent	14.3% peur de résultats		6.7% pas urgent
	2004	58.7% manque de temps	36.7% manque de temps	52% manque de temps	75% manque de temps	44% manque de temps
		15.2% estime être en bonne santé	8.2% estime être en bonne santé	18% peur de résultats		17% estime être en bonne santé

## CONCLUSION :

En général, une amélioration des connaissances et des comportements des enquêtés a été remarquée, quel que soit le groupe considéré. Toutefois, quoi qu'il y ait eu un progrès, les niveaux de certains indicateurs montrent que les changements observés ne sont pas encore satisfaisants. Par ailleurs, certains résultats méritent une attention particulière et fait appel à des interventions spécifiques, tels que :

- Augmentation du nombre de partenaires sexuels chez les jeunes garçons ;
- Niveau de connaissance des IST (chez les hommes et chez les femmes) relativement faible, quelque soient les groupes considérés
- Augmentation de la consommation de drogue chez les militaires et les camionneurs
- Augmentation de la proportion des TDS qui ont fait le test et n'ayant pas cherché le résultat

On note en particulier une nette amélioration de l'attitude vis-à-vis des PVVIH, le taux de dépistage, la connaissance de condom et dans une moindre mesure l'utilisation de préservatif.

## RECOMMANDATIONS :

Intensification des actions pour la prévention des IST et le développement des outils d'IEC spécifiquement relatifs au thème IST.

Prise en compte des problèmes spécifiques aux groupes cibles dans la formulation des messages relatifs aux IST, VIH et Sida.

Renforcement des actions entreprises pour la promotion de dépistage



